Répertoire des végétaux recommandés pour la

renaturalisation

des bandes riveraines de la municipalité de St-Ferdinand

ST-FERDINAND

Alnus crispa (Aulne crispée)

Exposition:

Hauteur: 2-3 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 1a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: rapide

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Tolère les sols acides, compacts et pauvres. Utilisé pour l'amélioration des sols. Plantes fixatrice N2 atmosphérique. Supporte les inondations.
Autres espèces possibles: Alnus rugosa

Amelanchier alnifolia (Amélanchier à feuilles d'aulnes)

Exposition:

Hauteur: 2.5 mètres

Largeur: 2 mètres

Rusticité: 2b

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: sableuse à loameuse
- pH: neutre

Floraison: printemps

Fructification: fin de l'été

Croissance: moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Préférence pour les sols bien drainés et meubles. Plante intéressante par sa fructification abondante et sa rusticité. Baies comestibles.

Autres espèces disponibles: amelanchier canandensis, fernaldii, laevis, sanguinea et stolonifera.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Amorpha fructicosa (Amorpha)

Exposition:

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 2 mètres

Rusticité: 3b

Sol:

- Humidité: élevée, moyenne ou faible
- Texture: tous
- pH: neutre

Floraison: juin à août (épis 15 à 20 cm)

Fructification: persiste l'hiver

Croissance: moyenne

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Approprié dans les endroits défavorables et les talus pauvres et humides.

Andromeda polifolia (Andromède à feuilles de polium)

Exposition:

Hauteur: 0.3-0.6mètres

Largeur: 0.6-0.9 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: sableuse à loameuse
- pH: acide

Floraison: mai à juin

Fructification: persiste l'hiver

Croissance: lente

Feuilles

Fleurs

<u>Autres caractéristiques</u>: Préfère les sols bien drainés et acides. Racines drageonnantes. Contrôle l'érosion. Arbustes aux tiges cassantes mais au très joli feuillage vert-bleuté.

Arctostaphylos uva-ursi (Raisin d'ours)

Exposition:

Hauteur: 0.3 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: sableuse, loameuse à argileuse
- pH: acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: moyenne

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Préférence pour les sols acides. Contrôle l'érosion. Arbuste rampant intéressant par sa forte rusticité et son entretien facile. Baies comestibles.

Aronia melanocarpa (Aronie noire)

Exposition:

Hauteur: 1.5-2 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 4a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Approprié dans les milieux ayant un sol tourbeux et acides. Racines drageonnantes. Intéressant par la coloration automnale de son feuillage (rouge-écarlate). Bonne capacité d'adaptation.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Caragana arborescens (Caraganier de Sibérie)

Exposition:

Hauteur: 5 mètres

Largeur: 3 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: sableuse, graveleuse
- pH: neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: été

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante souvent utilisée en haie libre ou taillée. Plantation facile, ne pas planter trop profondément. Plante fixatrice d'azote. Peu exigeant quant à la nature du sol, de culture et d'entretien.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Cephalanthus occidentalis (Céphalante occidental)

Exposition:

Hauteur: 1-3 mètres

Largeur: 3-4 mètres

Rusticité: 4a

Sol:

- Humidité: élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juillet-août

Fructification: automne

Croissance: moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Intolérance au compactage. Plante fixatrice d'azote. Plante intéressante pour sa floraison. Convient en sols marégageux et bords de rivages. Bonne rusticité.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Chamaedaphne calyculata (Cassandre caliculé)

Exposition:

Hauteur: 0.75 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: élevée
- Texture: tourbeuse
- pH: acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Branches aux extrémités retombantes. Ne supporte pas l'ombre. Supporte les inondations.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Comptonia peregrina (Comptonie voyageuse)

Feuilles

Fleurs

Exposition:

Hauteur: 0.6-0.9 mètres

Largeur: 1.2-2.4 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: sableuse, graveleuse
- pH: acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Préférence pour les sols tourbeux, pauvres et acides. Plante colonisante. Contrôle l'érosion. Coloration rouge à l'automne. Dégage un odeur agréable. Feuillage ressemblant aux fougères.

Cornus stolonifera (Cornouiller stolonifère)

Exposition:

Hauteur: 2 mètres

Largeur: 3 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: rapide

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante ignorée des cerfs. Excellent stabilisateur de talus. Intéressant pour la couleur de son feuillage à l'automne (bronze pourpre) et de son écorce l'hiver (rouge). Rabattre au sol périodiquement pour l'obtention de tiges plus colorées. Supporte les inondations. **Autres espèces disponibles: Cornus alternifolia, racemosa et rugosa.**

Diervilla lonicera (Dierville chèvrefeuille)

Exposition:

Hauteur: 0.9-1.2 mètres

Largeur: 0.9-1.2 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible à moyenne
- Texture: sableuse à graveleuse
- pH: acide

Floraison: été

Fructification: automne

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Bonne capacité d'adaptation. Drageonne mais non envahissante. Feuillage vert se colorant en rouge orangé à l'automne. Craint les sols mouillés.

Feuilles

Fleurs

Elaeagnus commutata (Chalef argenté)

Exposition:

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 3 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: sableuse à graveleuse
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin

Fructification: automne

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: S'accommode au terrains pauvres et secs. Résiste bien à la chaleur. Fort drageonnement.

Feuilles

Fleurs



Fruits

Hamamelis virginiana (Hamamélis de Virginie)

Exposition:

Hauteur: 5-7 mètres

Largeur: 5-6 mètres

Rusticité: 4

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: loameuse
- pH: acide à neutre

Floraison: octobre, novembre

Fructification: août, septembre

Croissance: lente à moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Adapté aux sols pauvres. Plante fixatrice d'azote. Contrôle l'érosion. Plante décorative par sa floraison automnale.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Hippophae rhamnoides (Argousier faux-nerprun)

Exposition:

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 2.5 mètres

Rusticité: 2b

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: sableuse
- pH: alcalin

Fructification: automne

Croissance: moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Planter en groupe pour obtenir des fleurs et des fruits. Plante adapté aux sols pauvres et aux vents. Plante fixant l'azote atmosphérique. Résiste à la chaleur et à la sécheresse. Utilisé pour fabriquer de la vitamine C. Tronc et rameaux épineux.

Feuilles

Fruits

Ilex verticillata (Houx verticillé)

Exposition:

Hauteur: 1.8-3 mètres

Largeur: 1.8-3 mètres

Rusticité: 3b

Sol:

- Humidité: élevée
- Texture: loameuse
- pH: très acide à acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Intéressant pour ses fruits persistant l'hiver (utilisés en fleuristerie pour la fête de Noël). Nécessite les deux sexes pour obtenir des fruits.
Autres espèces possibles: Ilex mucronata

Feuilles

Fleurs

Fruits

Juniperus communis (Genévrier commun)

Exposition:

Hauteur: 1.5-3 mètres

Largeur: 2.5-3.6 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Fructification: automne

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante peu utilisée à des fins ornementales. Peu exigeant, croît même dans les sols stériles et secs. Feuillage brunit l'hiver. Plante ignorée des cerfs. Contrôle l'érosion.

Feuilles

Fruits

Ledum groenlandicum (Thé du Labrador)

Exposition:

Hauteur: 0.6-1.2 mètres

Largeur: 0.8-1.5 mètres

Rusticité: 1a

Sol:

- Humidité: élevée
- Texture: sableuse
- pH: acide

Floraison: juin

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Particulièrement adapté aux milieux pauvres et défavorables. Aime les milieux marécageux. Supporte les inondations.

Feuilles

Fleurs

Lonicera canadensis (Chèvrefeuille du Canada)

Exposition:

Hauteur: 1-1.8 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: été

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Plantes intéressantes pour ses qualités d'adaptation, ses fleurs et ses fruits. Le feuillage devient jaune à l'automne. **Autres espèces possibles: Lonicera dioica et oblongifolia**

Feuilles

Fleurs

Myrica Gale (Myrique baumier)

Exposition:

Hauteur: 0.6-1.2 mètres

Largeur: 2 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: élevée
- Texture: loameuse
- pH: acide

Floraison: mai, juin

Fructification: automne

Croissance: moyenne

Feuilles

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Approprié en sol pauvre, intéressante pour ses fruits et l'odeur de ses feuilles (myrrhe). Supporte les inondations. Brise-glace. Contrôle l'érosion du sol. Idéale pour les bord de rives.

Physocarpus opulifolius (Physocarpe à feuilles d'obier)

Exposition:

Hauteur: 1.5-3 mètres

Largeur: 2-3 mètres

Rusticité: 2b

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin à juillet

Fructification: septembre à octobre

Croissance: moyenne

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Tolère les sols compacts et les conditions de sécheresse. Éviter les sols détrempés et calcaires. Plante intéressante par son écorce, ses fleurs et ses fruits. Les fruits deviennent rouge au cour de l'été.

Autres espèces possibles: Physocarpus opulifolius Dart's Gold et Diabolo.

Potentilla Fruticosa (Potentille frutescente)

Fleurs

Exposition:

Hauteur: 0.3-1.3 mètres

Largeur: 0.6-1.3 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin à octobre

Croissance: moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante intéressante pour sa floraison soutenue et ses qualité d'adaptation. S'adapte à presque tous les types de sol. Plante ignorée des cerfs.

Prunus besseyi (Cerisier des sables de l'Ouest)

Exposition:

Hauteur: 1.5 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: sableuse
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: fin mai

Fructification: juillet, août

Croissance: moyenne

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante intéressante par sa floraison, son feuillage et ses fruits. Convient en sols secs. Cerises comestibles et sucrés

Prunus tenella (Amandier nain de Russie)

Exposition:

Hauteur: 1.5 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: tous, mais préfère les sols loameux.
- pH: neutre

Floraison: mai

Fructification: fin juin

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante intéressante pour sa floraison et sa coloration automnale (orange).

Feuilles

Fleurs

Fruits

Rhododendron canadensis (Rhododendron du Can.)

Exposition:

Hauteur: 0.9-1.2 mètres

Largeur: 0.9-1 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous, mais préfère les sols tourbeux
- pH: acide

Floraison: juin à juillet

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante tout indiquée lorsque l'on veut créer un effet spectaculaire en sols acides, qu'ils soient humides ou secs. Floraison avant l'apparition du feuillage. Rustique jusqu'à -40°C.

Fleurs

Rhus aromatica (Sumac aromatique)

Exposition:

Hauteur: 0.6-1.8 mètres

Largeur: 1.8-3 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: faible à moyenne
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Espèce préférant les sols acides et bien drainés. Plante qui tend à drageonner. Feuilles vertes luisantes, aromatiques et rouge orangé l'automne. Fruits rouges, comestibles.

Rhus typhina (Sumac vinaigrier)

Exposition:

Hauteur: 4.5-7.6 mètres

Largeur: 4.5-9 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Espèce préférant les sols bien drainés. Plante qui tend à drageonner, appropriée dans les grands espaces. Remarquable coloris à l'automne.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Rosa blanda (Rosier inerme)

Exposition:

Hauteur: 1.5-2 mètres

Largeur: 1.2-1.5 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: faible à moyenne
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printanière

Fructification: automne

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Espèce préférant les sols bien drainés et tolère les sols lourds. Drageonne. Bonne résistance aux insectes et aux maladies.
Autres espèces disponbles: Rosa acicularis, nitida et rubiginosa.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Rubus odoratus (Ronce odorante)

Exposition:

Hauteur: 1.5-2mètres

Largeur: 1.5-2 mètres

Rusticité: 4

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: Sableuse
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printanière

Fructification: automne

Croissance: rapide

Feuilles

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Espèce préférant les sols riche, bien drainés et tolère les sols lourds. Drageonne.

Autres espèces possibles: Rubus allegheniensis et occidentalis

Salix pellita (Saule satiné)

Exposition:

Hauteur: 2-3 mètres

Largeur: 1.5-2 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Préfère les sols lourds et humide. Très résistant aux inondations.
Autres espèces possibles: Salix bebbiana, discolor, eriocephala, exigua et lucida.

Feuilles

Fleurs

Salix petiolaris (Saule à long pétiole)

Exposition:

Hauteur: 1-3 mètres

Largeur: 1-2 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Préfère les sols lourds et humides. Tolérant pour les sols pauvres et une sécheresse temporaire une fois établie.

Sambusus canadensis (Sureau du canada)

Exposition:

Hauteur: 1.5-3 mètres

Largeur: 1.5-2 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison : été

Fructification: septembre

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Les fruits sont utilisée pour faire des confitures, des tartes, du vin, etc. Redoute les terrains trop sec.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Sherpherdia canadensis (Shépherdie du Canada)

Exposition:

Hauteur: 1-2.5 mètres

Largeur: 1-2.4 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible
- Texture: sableuse
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison : printemps

Fructification: juin à juillet

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante fixatrice d'azote, utilisé pour limiter l'érosion des sols pauvres. Tolère très bien les sols calcaires. Feuillages de couleur pourpre à l'automne.

Autres espèces possibles: Sherpherdia argentea

Feuilles

Fleurs

Fruits

Spiraea latifolia (Spirée à larges feuilles)

Exposition:

Hauteur: 0.6-1.5 mètres

Largeur: 0.6-1.5 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison : été

Croissance: moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: S'adapte bien aux conditions du milieu. Plante utilisée pour la renaturalisation des sites.
Autres espèces possibles: Spiraea tomentosa

Feuilles

Fleurs

Symphoricarpos albus (Symphoricarpos albus)

Exposition:

Hauteur: 1-1.5 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: tous
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison : juillet à septembre

Fructification: septembre à novembre

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Tolère les sols pauvres et graveleux. Fleurit sur le bois de l'année.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Vaccinium angustifolium (Bleuet à feuilles étroites)

Exposition:

Hauteur: 0.6 mètres

Largeur: 0.6 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à moyenne
- Texture: sableuse à organique
- pH: acide

Floraison : mai

Fructification: juillet à août

Croissance: lente

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante drageonnante utilisée dans la culture fruitière.
Autres espèces possibles: Vaccinium macrocarpon et myrtilloides.

Feuilles

Fruits

Viburnum cassinoides (Viorne cassinoïde)

Exposition:

Hauteur: 1.5-2 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée
- Texture: loameux
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison : juin

Fructification: septembre

Croissance: lente à moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Plante ignorée des cerfs. Fructification qui attire les oiseaux. Convient en zones lacustres et dans les tourbières. Trop peu utilisée.
Autres espèces possibles: Viburnum, lantanoides, lentago, rafinesquianum.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Viburnum trilobum (Viorne trilobée)

Exposition:

Hauteur: 2.5-3.6 metres

Largeur: 2.5-3.6 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: loameux
- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison : juin

Fructification: septembre à octobre

Croissance: moyenne

<u>Autres caractéristiques</u>: Préférence pour les sols humides et bien drainés. Tolère les sols pauvres. Plante ignorée des cerfs. Fruits comestibles, persistant l'hiver, utilisé pour la fabrication de jus, de gelées et de confitures.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Apios americana (Patates en chapelet)

Exposition:

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 4

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: légèrement acide

Floraison : juillet à septembre

Fructification: estivale

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Gros épis de fleurs poussant sur de grosses tiges rendent cette plante tout à fait irrésistible. Peut devenir envahissante. Convient très bien aux zones inondées par la crue des eaux printanières. Chapelets de tubercules comestibles. **Plantes grimpantes.**

Fleurs

Feuilles

Fruits

Celastrus orbiculatus (Bourreau des arbres)

Exposition:

Hauteur: 10 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: tous
- pH: neutre

Floraison : juin à juillet

Fructification: octobre

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Très vigoureuse au feuillage jaune en automne. Plant mâle «Hercule» et femelle «Diana» sont nécessaire pour la pollinisation. Ne pas planter à proximité d'un arbre.
Plantes grimpantes.

Feuilles

Fleurs

Fruits

Humulus lupulus (Houblon)

Exposition:

Hauteur: 10 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne
- Texture: loameuse
- pH: neutre

Floraison : estivale

Fructification: automnale

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Les fruits sont utilisés pour calmer l'anxiété. La croissance reprend de la souche au primtemps.
Plantes grimpantes.

Fleurs

Fruits

Parthenocissus quinquefolia (Vigne vierge)

Exposition:

Hauteur: 15 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: faible à moyenne
- Texture: tous
- pH: légèrement acide

Fructification: estivale

Croissance: rapide

<u>Autres caractéristiques</u>: Espèces possédant des tiges ayant souvent des racines aériennes (se bouture facilement). Fruits bleu pouvant être toxique. Feuillage rouge vif à l'automne.
Plantes grimpantes.

Feuilles

Fruits

Vitis riparia (Vigne de rivages)

Exposition:

Hauteur: 5-6 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée
- Texture: tous
- pH: légèrement acide

Floraison: estivale

Fructification: automnale

Croissance: moyenne

Fleurs

Fruits

<u>Autres caractéristiques</u>: Espèces préférant les sols sableux à lourds. Tolère les inondations périodiques. Fruits et feuilles comestibles.
Plantes grimpantes.

Référence:

- La flore Laurentienne, frère Marie-Victorin, Gaétan Morin éditeur ltée, 2002, 1093 pages.
- Ministère du Développement durable, de l'environnement et des Parcs: http://www.mddep.gouv.qc.ca
- Regroupement des associations de lacs de l'Estrie (RAPPEL) : http://www.rappel.qc.ca
- Répertoire des arbres et arbustes ornementaux d'Hydro-Québec, troisième édition, Canada 2005, 547 pages.
- Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec: http://www.fihop.qc.ca et http://www.aqpp.org

Ce présent document conçu par la municipalité de St-Ferdinand, doit seulement être utilisé à des fins informatifs. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d’autres fins.